

## **ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА**

### **I. Контейнер для сбора:**

- Стерильный контейнер с красной крышкой

*\*Контейнеры для сбора материала можно получить в «Квалити Мед» - ул. Машинная. 1*

### **II. Последовательность сбора грудного молока:**

1. Подготовить заранее стерильный контейнер: вскрыть индивидуальную упаковку, приоткрыть крышку контейнера так, чтобы её можно было снять одной рукой. Не дотрагиваться руками до внутренних стенок контейнера и крышки;
2. Перед сцеживанием молока тщательно вымыть руки и молочные железы тёплой водой с мылом, осушить;
3. Обработать соски и область вокруг них ваткой/тампоном, смоченным 70% спиртом. Каждая молочная железа обрабатывается отдельным тампоном;
4. Сцедить первую порцию (5-10 мл) в отдельную ёмкость, данная порция не берётся на исследование;
5. Следующие 5-10 мл сцедить в стерильный контейнер с красной крышкой, не прикасаясь руками/молочными железами к внутренним стенкам контейнера и его крышке;
6. Молоко из каждой молочной железы собрать в отдельные контейнеры;
7. Плотнo закрыть крышки контейнеров;
8. Промаркировать: ФИО, дата/время забора, правая/левая молочная железа.

### **III. Информация о предварительной подготовке к исследованию:**

- Исследование проводится до начала приёма антимикробных препаратов или спустя 12-14 дней после окончания приёма. Если антимикробные препараты уже принимаются, забор материала на исследование проводится в момент наименьшей концентрации антибиотика в крови;

- Подготовка определяется лечащим врачом в индивидуальном порядке.
- Не допускается замораживать пробу.